arXiv:math/0703276v1 [math.AT] 9 Mar 2007

# SUR LA CONJECTURE DES FIBRÉS DE SEIFERT

Jean-Philippe PRÉAUX[1] [2]

Résumé. Nous rappelons l'historique de la démonstration de la conjecture des fibrés de Seifert ainsi que ses motivations et ses diverses généralisations.

## Introduction

La conjecture des fibrés de Seifert a pour objet la caractérisation des fibrés de Seifert dans la classe des 3-variétés orientables irréductibles à $\pi_1$ infini par une propriété de leur groupe fondamental : nommément l'existence d'un sous-groupe normal cyclique non trivial. Il s'agit d'une question de grande importance en topologie des 3-variétés car reliée à diverses autres conjectures de grand impact, comme nous ne le verrons par la suite. C'est désormais un théorème dont la démonstration a necessité le travail de nombreux mathématiciens durant près d'un demi-siècle ; l'un de ces théorèmes "monstrueux" qu'ont vu apparaître les mathématiques du vingtième siècle. Nous rappelons ici ses motivations, ses diverses généralisations ainsi que l'historique de leur démonstration. Le lecteur est supposé être familiarisé avec la topologie des 3-variétés.

## 1. Enoncé de la conjecture des Fibrés de Seifert

Un groupe fondamental infini d'un fibré de Seifert contient un sous-groupe normal cyclique infini. La conjecture des fibrés de Seifert (ou CFS) caractérise les espaces fibrés de Seifert dans la classe des 3-variétés orientables irréductibles à $\pi_1$ infini par le biais de cette propriété. Elle s'énonce :

**Conjecture 1.** *Soit $M$ une 3-variété orientable irréductible dont le $\pi_1$ est infini et contient un sous-groupe normal cyclique non trivial. Alors $M$ est un fibré de Seifert.*

Elle se généralise au cas non-orientable :

**Conjecture 2.** *Soit $M$ une 3-variété $\mathbb{P}_2$-irréductible dont le $\pi_1$ est infini et contient un sous-groupe normal cyclique non trivial. Alors $M$ est un fibré de Seifert.*

**Remarques :** – Des arguments classiques de topologie algébrique et le théorème de la sphère montrent qu'une 3-variété $\mathbb{P}_2$-irréductible à $\pi_1$ infini a un groupe libre de torsion. Ainsi dans ces conjectures on peut remplacer "... dont le $\pi_1$ est infini et contient un sous-groupe normal cyclique non trivial." par : "... dont le $\pi_1$ contient un sous-groupe normal cyclique infini.".
– Un fibré de Seifert orientable est soit irréductible soit homéomorphe à $S^1 \times S^2$ ou à

[1]Centre de recherche de l'Armée de l'Air, Ecole de l'air, F-13661 Salon de Provence air
[2]Centre de Mathématiques et d'informatique, Université de Provence, 39 rue F.Joliot-Curie, F-13453 marseille cedex 13
*E-mail :* preaux@cmi.univ-mrs.fr
*Mathematical subject classification : 57N10, 57M05, 55R65.*

$\mathbb{P}^3\#\mathbb{P}^3$. Comme conséquence du théorème de Kneser-Milnor, une 3-variété orientable $M$ non irréductible contenant un sous-groupe normal cyclique non trivial est soit $S^1 \times S^2$, soit $M'\#C$ avec $M'$ irréductible et $C$ simplement connexe, soit a pour $\pi_1$ le groupe diédral infini. Si l'on accepte la conjecture de Poincaré (aujourd'hui démontrée par les travaux de Perelman, récompensé d'une médaille Fields en 2006) $M$ ne peut être qu'obtenu à partir de $S^1 \times S^2$, $\mathbb{P}^3\#\mathbb{P}^3$ ou d'une 3-variété irréductible en lui retirant un nombre fini de boules.
– Un fibré de Seifert non-orientable est quant à lui soit $\mathbb{P}^2$-irréductible soit $S^1 \ltimes S^2$ ou $\mathbb{P}^2 \times S^1$. Une large classe de 3-variétés irréductibles et non $\mathbb{P}^2$-irréductible n'admettent aucune fibration de Seifert tandis que leur $\pi_1$ contient un $\mathbb{Z}$ distingué. Nous verrons que le résultat se généralise cependant aussi dans ce cas en considérant les fibrés de Seifert mod $\mathbb{P}$.

La CFS est aujourd'hui devenue un théorème, grâce au travail commun (énorme) des Mathématiciens : Waldhausen ([Wa-67]), Gordon et Heil ([GH-75]), Jaco et Shalen ([JS-79]), pour le cas Haken ; Scott ([Sc-83]), Mess ([Me]), Tukia ([Tu-88]), Casson et Jungreis ([CJ-94]), Gabai ([Ga-92]), pour le cas orientable non Haken ; et Heil et Whitten ([Wh-92, HW-94]) pour le cas non-orientable ; on peut aussi citer Maillot ([Ma-01], [Ma-03]) et Bowditch ([Bo-04]) qui donnent une preuve alternative incluant le résultat non-publié de Mess.

Remarquons aussi que le théorème se généralise de diverses façons : aux 3-variétés ouvertes, aux 3-orbiétés ([Ma-03]), et aux groupes $PD(3)$ ([Bo-04]), ou encore en affaiblissant la condition d'existence d'un $\mathbb{Z}$ distingué en l'existence d'une classe de conjugaison finie non triviale ([HP-05]).

## 2. Motivations

Historiquement, trois questions d'importance ont motivé la CFS. D'abord la conjecture du centre (1960's), puis le strong torus theorem de Scott (1978), et enfin le programme de géométrisation de Thurston (1980's).

### 2.1. **Conjecture du centre.**

Il s'agit du problème 3.5 de la liste de Kirby, attribué à Thurston. :

**Conjecture :** *Soit $M$ une 3-variété orientable irréductible ayant un $\pi_1$ infini et un centre non trivial, alors $M$ est un fibré de Seifert.*

C'est clairement un corollaire immédiat de la conjecture des fibrés de Seifert. Après avoir été observé et successivement prouvé pour tous les compléments de noeuds (Murasugi ([Mu-61]), Neuwirth ([Ne-61]) en 1961 pour les noeuds alternés, et Burde et Zieschang ([BZ-66]) en 1966 pour tous les noeuds), il a été démontré en 1967 par Waldhausen ([Wa-67]) dans le cas où $M$ est Haken, qui est somme toute plus général que les précédents.

Le sous-groupe normal cyclique infini d'un $\pi_1$ de fibré de Seifert orientable est central si et seulement si la base de la fibration associée est orientable. Un fibré de Seifert à $\pi_1$ infini et à base non-orientable n'a quant à lui pas de centre, mais un sous-groupe normal cyclique non trivial. La CFS généralise la conjecture du centre en ce sens.

2.2. **Le théorème du tore.** La conjecture appelée "théorème du tore" s'énonce :

**Conjecture :** *Soit $M$ une 3-variété orientable irréductible avec $\pi_1(M) \supset \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Alors soit $M$ contient un tore incompressible, soit $M$ est un (small) fibré de Seifert.*

Elle a été démontrée dans le cas où $M$ est Haken par Waldhausen en 1968 (annoncé dans [Wa-68], écrit et publié par Feustel dans [F1-76, F2-76]). Avec la théorie des 3-variétés *suffisament grandes* dévellopée par Haken celà mena (1979) à l'apparition de la décomposition *Jaco-Shalen-Johansen* des 3-variétés Haken.

En 1978 Scott démontre ([Sc-78]) le "strong torus theorem" :

**Strong torus theorem :** *Soit $M$ une 3-variété orientable irréductible, avec $\pi_1(M) \supset \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Alors soit $M$ contient un tore incompressible, soit $\pi_1(M)$ contient un sous-groupe normal cyclique non trivial.*

Avec le strong torus theorem, pour prouver le théorème du tore il suffit de prouver la conjecture des fibrés de Seifert.

2.3. **La conjecture de géométrisation.** La conjecture de géométrisation de Thurston entraînerait la classification des 3-variétés. Elle suppute que les pièces obtenues dans la décomposition topologique canonique d'une 3-variété orientable, le long de sphères disques et tores essentiels, ont un intérieur métrisable au sens de Riemann de façon complète et localement homogène. L'intérieur des pièces est alors modelé sur l'une des 8 géométries homogènes 3-dimensionnelles : les 3 isotropes, l'elliptique $\mathbb{S}^3$, l'euclidienne $\mathbb{E}^3$ et l'hyperbolique –la générique– $\mathbb{H}^3$, les 2 géométries produits $\mathbb{S}^2 \times \mathbb{R}$ et $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$, et les 3 géométries twistées, $Nil$, $Sol$, et le revêtement universel de $SL_2\mathbb{R}$. Une 3-variété orientable admet une fibration de Seifert exactement lorsque son intérieur est modelé sur l'une des 6 géométries autres que $Sol$ et $\mathbb{H}^3$.

Thurston (*et al...*) a montré la conjecture de géométrisation dans le cas Haken :

**Théorème de géométrisation de Thurston :** *Si $M$ est Haken alors $M$ vérifie la conjecture de géométrisation de Thurston.*

Pour prouver la conjecture dans les cas restants il suffit de prouver sous l'hypothèse que $M$ est une 3-variété orientable irréductible fermée, les 3 conjectures :

*-1- Si $\pi_1(M)$ est fini alors $M$ est elliptique (conjecture d'orthogonalisation).*

*-2- Si $\pi_1(M)$ est infini et contient un sous-groupe normal cyclique non trivial alors $M$ est un fibré de Seifert (conjecture des fibrés de Seifert.)*

*-3- Si $\pi_1(M)$ est infini et ne contient pas de sous-groupe normal cyclique non trivial, alors $M$ est géométrisable.*

A la lumière du strong torus theorem, du théorème de géométrisation de Thurston et du fait qu'une 3-variété fermée modelée sur l'une des 7 géométries non hyperboliques a un $\pi_1$ contenant $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, le point 3 devient :

*-3- Si $\pi_1(M)$ est infini et ne contient pas $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ alors $M$ est hyperbolique (conjecture d'hyperbolisation).*

Ainsi la conjecture des fibrés de Seifert apparaît comme un des 3 pans de la conjecture de géométrisation... Celui considéré comme le plus facile ; par ailleurs le premier à avoir été démontré. Les deux derniers pans sont quant à eux en passe

d'être démontrés par les travaux de Perelman ; il a suivi le programme d'Hamilton utilisant le flôt de Ricci.

## 3. Historique de la démonstration de CFS

3.1. **Le cas Haken orientable.** L'historique de la preuve est le suivant :

**1967.** Waldhausen ([Wa-67], [F1-76, F2-76]) montre qu'une 3-variété Haken $M$ a un $\pi_1$ à centre non trivial si et seulement si c'est un fibré de Seifert à base orientable.

Il motive ainsi la conjecture des fibrés de Seifert, et résout le cas Haken lorsque le sous-groupe cyclique normal est central.

**1975.** Gordon et Heil ([GH-75]) montrent partiellement la CFS dans le cas Haken : soit $M$ est un Seifert soit obtenu en recollant deux copies d'un $I$-fibré non trivial sur une surface non-orientable. Ils réduisent ainsi les cas Haken restants à ces dernières 3-variétés.

**1979.** Jaco et Shalen ([JS-79]), et indépendamment MacLachlan (non publié) achèvent la preuve pour les 3-variétés orientables Haken restantes.

3.2. **Le cas non Haken, orientable.** Avec le cas Haken déjà établi, il est suffisant de se restreindre au des 3-variétés closes. La preuve a procédé ainsi :

**1983.** Scott ([Sc-83]) (généralisant un résultat de Waldhausen dans le cas Haken) montre que :

*Soient $M$ et $N$ deux 3-variétés closes orientables irréductibles ; où $N$ est un fibré de Seifert à $\pi_1$ infini. Si $\pi_1(M)$ et $\pi_1(N)$ sont isomorphes, alors $M$ et $N$ sont homéomorphes.*

**Remarque :** Par hypothèse, avec le théorème de la sphère et des arguments classiques de topologie algébrique, $M$ et $N$ sont des $K(\pi, 1)$. Avec le théorème de Moise (...), on peut les considérer dans la catégorie PL. Ainsi la condition "$\pi_1(M)$ et $\pi_1(N)$ sont isomorphes" peut-être remplacée par "$M$ et $N$ ont même type d'homotopie".

Ainsi Scott réduit la conjecture des fibrés de Seifert à :

*Si $\Gamma$ est le groupe d'une 3-variété close irréductible orientable contenant un $\mathbb{Z}$ distingué, alors $\Gamma$ est le groupe d'un fibré de Seifert clos orientable.*

Il remarque en outre que $\Gamma$ est le groupe d'un fibré de Seifert (clos orientable) si et seulement si $\Gamma/\mathbb{Z}$ est le groupe d'une 2-orbiété (close éventuellement non-orientable) ; c'est aussi le lemme 15.3 de [Bo-99]. Ainsi finalement, il réduit la preuve de la conjecture des fibrés de Seifert à prouver la conjecture :

**Si $\Gamma$ est le groupe d'une 3-variété orientable close contenant $\mathbb{Z}$ distingué, alors $\Gamma/\mathbb{Z}$ est le groupe d'une 2-orbiété (close)**.

**Fin 80'.** Mess ([Me]) montre dans un papier malheureusement jamais publié que :

*Si $M$ est close orientable irréductible avec $\Gamma = \pi_1(M)$ contenant un sous-groupe cyclique infini $C$ :*
*– Le revêtement de $M$ associé à $C$ est homéomorphe à la variété ouverte $D^2 \times S^1$.*
*– L'action de revêtement de $\Gamma/C$ sur $D^2 \times S^1$ descend en une action vaguement définie sur $D^2 \times 1$ : dans sa terminologie $\Gamma/C$ est coarse quasi-isometric au plan euclidien ou hyperbolique.*
*– Dans le cas où $\Gamma/C$ est coarse quasi-isometric au plan euclidien, alors c'est le*

*groupe d'une 2-orbiété, et donc $M$ est un fibré de Seifert (avec le résultat de Scott).*
*– Dans le cas restant où $\Gamma/C$ est coarse quasi-isometric au plan hyperbolique, $\Gamma/C$ induit une action sur le cercle à l'infini, qui fait de $\Gamma/C$ un groupe de convergence.*

Un *groupe de convergence* est un groupe $G$ agissant par homéomorphisme préservant l'orientation sur le cercle, de façon à ce que si l'on considère l'ensemble $T$ des triplés ordonnés : $(x, y, z) \in S^1 \times S^1 \times S^1$, $x \neq y \neq z$, tels que $x, y, z$ apparaissent dans cet ordre sur $S^1$ en tournant dans le sens positif, l'action de $G$ induite sur $T$ est libre et proprement discontinue.

Avec le travail de Mess, la preuve de la conjecture des fibrés de Seifert se réduit à montrer la conjecture :

**Les groupes de convergence sont des groupes de 2-orbiétés.**

**1988.** Tukia montre ([Tu-88]) que certains (lorsque $T/\Gamma$ non compact et $\Gamma$ n'a pas d'éléments de torsion d'ordre $> 3$) groupes de convergence sont des groupes Fuchsiens, et en particulier des $\pi_1$ de 2-orbiétés.

**1992.** Gabai montre ([Ga-92]) indépendamment des autres travaux et en toute généralité que les groupes de convergence sont des groupes fuchsiens (agissant sur $S^1$, à conjugaison dans $Homeo(S^1)$ près, comme la restriction à $S^1 = \partial\mathbb{H}^2$ de l'action d'un groupe fuchsien sur $\bar{\mathbb{H}}^2$).

**1994.** Parallèlement Casson et Jungreis montrent les cas laissés restants par Tukia ([CJ-94]).

**Ainsi la conjecture des fibrés de Seifert est prouvée, et avec elle la conjecture du centre, le théorème du tore, et une des trois conjectures de géométrisation.**

**1999.** Bowditch obtient une preuve différente de la conjecture des fibrés de Seifert ([Bo-99], [Bo-04]). Sa preuve se généralise à d'autres types de groupes, comme les groupes $PD(3)$ par exemple.

**2000.** Maillot, dans sa thèse, étend les techniques de Mess pour établir une preuve de la conjecture des fibrés de Seifert dans le cas des 3-variétés ouvertes ainsi que des 3-orbiétés, généralisant le cas des 3-variétés. Ce résultat, déjà connu comme conséquence de la conjecture des fibrés de Seifert (en tant que prouvée par Mess, *et al...*) et du théorème des orbiétés de Thurston, a le mérite d'être redémontré en n'utilisant aucun de ces résultats, et d'obtenir comme corollaire une preuve propre de la conjecture de Seifert et des techniques de Mess.

L'argument de Mess est repris dans [Ma-03] où il se ramène aux groupes quasi-isométriques à un plan riemannien, et il montre dans [Ma-01] que ces derniers sont virtuellement des groupes de surface.

3.3. **Le cas non-orientable.** Le cas non-orientable a été traité par Whitten et Heil.

**1992.** Whitten montre dans [Wh-92] la CFS pour $M$ non-orientable irréductible, qui n'est pas un faux $\mathbb{P}_2 \times S^1$, et tel que $\pi_1(M)$ ne contient pas $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_2$. Il obtient

en particulier la conjecture 2, ou CFS dans le cas $\mathbb{P}_2$-irréductible.

**1994.** Heil et Whitten dans [HW-94] caractérisent les 3-variétés irréductibles non-orientables ne contenant pas un faux $\mathbb{P}_2 \times I$ et dont le $\pi_1$ contient un $\mathbb{Z}$ distingué et éventuellement $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_2$ : ce sont les fibrés de Seifert mod $\mathbb{P}$ : obtenus à partir d'une 3-orbiété fibré de Seifert en retirant tous les voisinages des points singuliers homéomorphes à des cônes sur $\mathbb{P}_2$ : leur bord contient en général des $\mathbb{P}_2$ et dans le cas contraire il s'agit d'un fibré de Seifert. Le résultat devient :

**Théorème 1.** *Si $M$ est une 3-variété non-orientable irréductible ne contenant pas un faux $\mathbb{P}_2 \times I$ avec $\pi_1(M)$ contenant un sous-groupe cyclique non trivial alors $M$ est soit $\mathbb{P}_2 \times I$ soit un fibré de Seifert mod $\mathbb{P}$.*

Ils montrent aussi le théorème du tore dans le cas non-orientable, et déduisent la géométrisation dans le cas non orientable (*i.e.* le revêtement d'orientation est géométrisable) si la 3-variété ne contient pas de faux $\mathbb{P}_2 \times I$.

### 3.4. **Avec la conjecture de Poincaré.**

**2003-06.** Les travaux de Perelman (2003) récompensés en 2006 par une médaille Fiels établissent la conjecture de Poincaré. Ainsi toute 3-variété fermée simplement connexe est une 3-sphère et il n'existe ni fausse boule ni faux $\mathbb{P}_2 \times I$. Aussi on peut supprimer dans le théorème de CFS l'hypothèse d'irréducibilité sans trop alourdir l'énoncé.

**Théorème 2.** *Soit $M$ une 3-variété dont le $\pi_1$ est infini et contient un sous-groupe normal cyclique non trivial. Alors après avoir bouché les sphères de $\partial M$ avec des boules on obtient soit une somme connexe de $\mathbb{P}_2 \times I$ avec lui-même ou avec $\mathbb{P}_3$, soit un fibré de Seifert mod $\mathbb{P}$.*

On obtient un fibré de Seifert exactement lorsque $\pi_1(M)$ ne contient pas $\mathbb{Z}_2$ ou de façon équivalente lorsque $\partial M$ ne contient pas de $\mathbb{P}_2$.

### 3.5. **Groupes de 3-variétés à classes de conjugaison infinies.**

**2005.** de la Harpe et l'auteur montrent dans [HP-05] que dans le cas des 3-variétés et des groupes $PD(3)$ l'hypothèse "*contient un sous-groupe normal cyclique non trivial*" peut être affaiblie en "*contient une classe de conjugaison finie non triviale*" ou de façon équivalente en "*a une algèbre de Von-Neumann qui n'est pas un facteur de type $II-1$*".

## Références

[Mu-61] K.Murasugi, *Remarks on torus knots*, Proc. Japan Acad. **37** (1961), 222.

[Ne-61] L.Neuwirth, *A note on torus knots and links determined by their groups*, Duke Math. J. **28** (1961), 545-551.

Preuve de la conjecture du centre pour les neuds alternés.

[BZ-66] G.Burde et H.Zieschang, *Eine kennzeichnung der Torusknotten*, Math. Ann. **167** (1966), 169-176.

Preuve de la conjecture du centre pour les compléments de noeuds : ceux dont le $\pi_1$ a un centre $\neq 1$ sont compléments de noeuds toriques.

[Wa-67] F.Waldhausen, *Gruppen mit Zentrum und 3-dimensionale Mannigfaltigkeiten*, Topology **6** (1967), 505-517.

Les variétés Haken dont le groupe a un centre non trivial sont des fibrés de Seifert.

[Wa-68] F.Waldhausen, *On the determination of some bounded 3-manifolds by their fundamental groups alone*, Proc.Int.Symp.Top.Hercy-Novi, Yugoslavia, (1968), 331-332.

Annonce du théorème du tore dans le cas Haken.

[GH-75] C.Gordon et W.Heil, *Cyclic normal subgroups of fundamental groups of 3-manifolds*, Topology **14** (1975), 305-309.

CFS partiellement obtenu dans le cas Haken : soit $M$ est un fibré de Seifert soit $M$ est obtenu en recollant deux copies d'un $I$-fibré non trivial.

[F1-76] C.Feustel, *On the Torus theorem and its applications*, Trans. A.M.S. **217** (1976), 1-43.

[F2-76] C.Feustel, *On the Torus theorem for closed 3-manifolds*, Trans. A.M.S. **217** (1976), 45-57.

Démonstration du théorème du tore dans le cas Haken, comme résolu par Waldhausen.

[Sc-78] P.Scott, *A new proof of the annulus and torus theorems*, Amer.J.Math. **2** (1978), 241-277.

Le "Strong Torus Theorem".

[JS-79] W.Jaco et P.Shalen, *Seifert fibered spaces in 3-manifolds*, Memoirs A.M.S. **2** (1979).

Fin de la démonstration de CFS dans le cas Haken. Mais aussi surtout le théorème Jaco-Shalen-Johansen.

[Sc-83] P.Scott, *There are no fake Seifert fibre spaces with infinite* $\pi_1$, Annals of Math., **117** (1983), 35-70.

Théorème de rigidité pour les fibrés de Seifert.

[Me] G.Mess, *Centers of 3-manifold groups, and groups which are coarse quasi-isometric to planes*, Unpublished.

Ramène la CFS à prouver que les groupes de convergence du cercle sont virtuellement des groupes de surface.

[Tu-88] P.Tukia, *Homeomorphic conjugates of Fuchsian groups*, J.Reine Angew.Math. **391** (1988), 35-70.

Résout partiellement la conjecture des groupes de convergences.

[Ga-92] D.Gabai, *Convergence groups are Fuchsian groups*, Annals of Math. **136** (1992), 447-510.

Montre que les groupes de convergence du cercle sont des groupes Fuchsiens ; il déduit en corollaire la CFS, le théorème du tore et la géométrisation dans ce cas.

[Wh-92] W.Whitten, *Recognizing nonorientable Seifert bundles*, J.Knot theory & Ram., **1** (1992), 471-475

La CFS dans le cas non-orientable.

[CJ-94] A.Casson et D.Jungreis, *Convergence groups and Seifert fibered 3-manifolds*, Invent. Math., **118** (1994), 441-456.

Apportent indépendamment de Gabai une solution en donnant une solution aux cas laissés manquants par Tukia, et en déduisent la CFS.

[HW-94] W.Heil, et W.Whitten, *The Seifert fiber space conjecture and torus theorem for non-orientable 3-manifolds*, Canad.Math.Bull. **37** (4) (1994), 482-489.

Le cas non-orientable irréductible non $\mathbb{P}_2$-irréductible de CFS. Ils en déduisent le théorème du tore et la géométrisation dans ce cas (modulo des faux $\mathbb{P}_2 \times S^1$, c'est à dire modulo la conjecture de Poincaré.)

[Bo-99] B.Bowditch, *Planar groups and the Seifert conjecture*, preprint (1999).

[Bo-04] B.Bowditch, *Planar groups and the Seifert conjecture*, J.Reine angew.Math., **576** (2004), 11-62.

Donne une preuve indépendante de la CFS ; elle se généralise aux groupes $PD(3)$.

[Ma-01] S.Maillot, *Quasi-isometries of groups, graphs and surfaces*, Comment. Math. Helv., **76** (1) (2001), 29-60.

Où il est montré que les groupes quasi-isométriques à une surface riemanienne complète simplement connexe sont les groupes virtuellement de surface.

[Ma-03] S.Maillot, *Open 3-manifolds whose fundamental groups have infinite center, and a torus theorem for 3-orbifolds*, Trans. of the A.M.S., **355** (11) (2003), 4595-4638.

Etend la stratégie de Mess *et al*, pour retrouver la CFS dans le cas des 3-orbiétés, et en corollaire une preuve complète de CFS.

[HP-05] P.de la Harpe et J.-P.Préaux, *Algèbres d'opérateurs et groupes fondamentaux des 3-variétés*, ArXiV math.GR/0509449, preprint (2005).

La condition que le groupe contienne un $\mathbb{Z}$ distingué dans la CFS peut être affaiblie par la condition qu'il contienne une classe de conjugaison finie non triviale, ou de façon équivalente que son algèbre de Von-Neumann ne soit pas un facteur de type $II-1$.